


IMPFPPLAN 2011

nach Bundesamt für Gesundheit



Alter	Basis-Impfungen	Ergänzende Impfungen
2 Monate	Diphtherie, Tetanus ^{a)} , Pertussis ^{b)} Polio ^{c)} , Hib ¹ , Hepatitis B	Pneumokokken
4 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis Polio, Hib ¹ , Hepatitis B	Pneumokokken
6 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis Polio, Hib ¹ , Hepatitis B	
12 Monate	Masern, Mumps, Röteln	Pneumokokken (Nachholimpfung bis 5. Geb.)
12–15 Mte.		Meningokokken C: 1. Dosis (Nachholimpfung bis 5. Geb.)
15–24 Mte.	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Hib ¹ , Hepatitis B, Masern, Mumps, Röteln	
4–7 Jahre	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio	
11–14 Jahre	HPV ² (3 Dosen für Mädchen)	
11–15 Jahre	dT ³ oder dTp _a ⁴ oder dTp _a -IPV ⁵ Hepatitis B (2 oder 3 Dosen je nach Impfstoff) Varizellen ^{d)} (2 Dosen)	Meningokokken C: 2. Dosis (od. Nachholimpfung bis 20 Jahre)
15–26 Jahre	Nachholimpfung HPV ² (3 Dosen für Mädchen und junge Frauen)	
Erwachsene	Diphtherie, Tetanus (alle 10 Jahre) Polio (Auffrischung vor Reisen in Risikogeb.) Nachholimpfung Masern, Mumps, Röteln Nachholimpfung Varizellen ⁶ Grippe ab 65 Jahren (jährlich) Pneumokokken ab 65 Jahren (1. Dosis)	Nachholimpfung HPV (3 Dosen)



- ¹ Hib = *Haemophilus influenzae* Serotyp B
- ² HPV = Humane Papillomaviren
- ³ dT = Diphtherie, Tetanus
- ⁴ dTp_a = Diphtherie, Tetanus, Pertussis
- ⁵ dTp_a-IPV = Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio
- ⁶ total 2 Dosen bis 40-jährig

- a) Tetanus = Starrkrampf
- b) Pertussis = Keuchhusten
- c) Polio = Kinderlähmung
- d) Varizellen = Windpocken / Spitze Blattern

